NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

Behandling af demens ved Downs syndrom

Der er etableret særlige institutionspladser for udviklingshæmmede med demens, men antallet er begrænset. Da der er tale om en Alzheimerlignende demens, virker det nærliggende at behandle symptomerne med de medicintyper, der er udviklet til behandling af Alzheimers sygdom.

Datagrundlaget er dog meget spinkelt. Indtil videre er kun én af de tre typer af kolinesterasehæmmere systematisk afprøvet på personer med Downs syndrom og Alzheimerlignende demens.

Det drejer sig om en randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af behandling med donepezil, der inkluderede 30 personer i et 24-ugers studieforløb efterfulgt af et *open label* studie. Resultaterne peger i retning af en beskeden, ikke-signifikant positiv effekt af donepezil, men de udgør ikke nogen tilstrækkelig evidens, som beslutninger om behandling kan baseres på.

Der foreligger så vidt man ved ingen systematiske afprøvninger af effekten af hverken memantin eller af de to øvrige typer af kolinesterasehæmmere på personer med Downs syndrom og demens. Fire Cochrane-reviews fra 2009, der gennemgik forskningen vedrørende medicinsk behandling af demens ved Downs syndrom, konkluderede samstemmende, at der mangler viden og evidens indenfor området.

Salem LC, Jorgensen K. Demens hos personer med Downs syndrom. Ugeskrift for Læger. 2014;176(26):V04120217

PubMed

Senest opdateret: 13. august 2020