

Emneoversigt



Varighed: 05:56



Varighed: 07:17

NYHED

10. oktober 2023

Hjerteanfald øger risiko for kognitiv svækkelse på langt sigt

Personer, der har haft et eller flere hjerteanfald, har – selvom de kommer sig – øget risiko for på længere...

ARTIKEL

Effekt af kolinesterasehæmmere ved vaskulær demens

Effekten af de tre kolinesterasehæmmere donepezil, galantamin og rivastigmin på vaskulær demens er undersøgt i seks randomiserede kontrollerede kliniske forsøg...

ARTIKEL

Behandling af vaskulær demens

Ved vaskulær demens er effekten af kolinesterasehæmmere og memantin af tvivlsom klinisk relevans.

ARTIKEL

IV – Eksklusionskriterier for vaskulær kognitiv lidelse

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse. Del 4 af 4.

ARTIKEL

III – Det patologiske grundlag for vaskulær kognitiv lidelse

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse. Del 3 af 4.

ARTIKEL

II – Dokumentation for vaskulær ætiologi

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse. Del 2 af 4.

ARTIKEL

I – Diagnosekriterier for demens og mild cognitive disorder

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse. Del 1 af 4.

ARTIKEL

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse

The International Society for Vascular Behavioral and Cognitive Disorders (VASCOG) udarbejdede i 2014 et detaljeret forslag til diagnosekriterier for kognitiv...